





شماره ۱	نوبت: اردیبهشت ماه (شبه نهایی ۴۰۵)	رشته: ریاضی و فیزیک	پایه: دوازدهم	سؤالات آزمون درس: حسابان ۲
ردیف	سؤالات پاسخ‌برگ دارد- استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.			
۱	درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. الف) نمودار تابع $y = x^2$ در بازه $(0, 1)$ زیر نمودار تابع $y = x^3$ است. ب) عبارت $x^4 + y^4$ بر عبارت $x - y$ بخش پذیر است. ج) تابع $f(x) = 3$ یک مجانب افقی دارد. د) اگر برای تابع f داشته باشیم $f'(a) = 0$، آنگاه a نقطه اکسترمم نسبی تابع است.			
۲	جاهای خالی را با توجه به عبارتهای داخل کمانک کامل کنید. الف) معادله $\cos x = 0$ در بازه $[0, 2\pi]$ دارای جواب است. (یک - دو - سه - چهار) ب) یک تابع می‌تواند مجانب قائم داشته باشد. (حداقل ۲ - حداکثر ۲ - بی‌شمار) ج) تابع $f(x) = [x]$ در بازه $(0, 2)$ دارای نقطه ماکسیمم نسبی است. (صفر - یک - دو - بی‌شمار) ($[]$ نماد جزء صحیح است) د) تابع $f(x) = x$ در بازه $[-1, 1]$ دارای نقطه بحرانی است. (صفر - یک - دو - سه)			
۳	نمودار تابع $y = f(x)$ در زیر رسم شده است. نمودار تابع $y = 1 - f(1 - 2x)$ را رسم کنید. 			
۴	فرض کنیم $\log_{\frac{2}{3}}(2x - 1) \leq \log_{\frac{2}{3}}(2 - x)$. حدود x را بیابید.			
۵	مقادیر a، b را چنان بیابید که چندجمله‌ای $2x^3 - ax + b$ بر عبارت $1 - x$ بخش پذیر باشد و باقی‌مانده تقسیم آن بر عبارت $2 + x$ برابر ۹- باشد.			
۶	چند مثلث به مساحت ۳ سانتی‌متر مربع داریم که طول دو ضلع آن ۵ و ۷ سانتی‌متر باشد؟ چرا؟			
۷	توابع $y = \cos x - \sin x$ و $y = \sqrt{2}$ را در نظر بگیرید. با تشکیل یک معادله مثلثاتی و حل آن، تعیین کنید این دو تابع در بازه $[0, 2\pi]$ چند نقطه برخورد دارند؟ طول نقطه یا نقاط برخورد را به دست آورید.			

۱/۲۵	۸	قسمتی از نمودار تابع $y = a \sin(bx) + c$ در زیر رسم شده است. با ارائه دلیل، مقادیر a, b, c را به دست آورید. ($b > 0$) 
۱	۹	نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر است. موارد خواسته شده را بنویسید.  الف) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ج) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ د) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$
۱/۲۵	۱۰	نمودار تابع $f(x) = \frac{2x^2 - x - 6}{x^2 - 4x + 4}$ را در اطراف مجانب قائم آن رسم کنید. (با ارائه دلیل)
۱/۲۵	۱۱	حدود زیر را به دست آورید. (نماد جزء صحیح است) الف) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - 2x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ ب) $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{[x]}{\tan x}$
۱/۲۵	۱۲	قضیه: اگر تابع f در نقطه a مشتق پذیر باشد، در این نقطه پیوسته است.
۱/۵	۱۳	مشتق توابع زیر را به دست آورید: (ساده کردن مشتق لازم نیست) الف) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} + 6}{2x^2 - x - 1}$ ب) $f(x) = x^2 \cdot \sin^3 x$
۱/۲۵	۱۴	مشتق پذیری تابع $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & x < -1 \\ x^2 - 4 & x \geq -1 \end{cases}$ را در نقطه به طول ۱- بررسی کنید.
۱	۱۵	معادله حرکت یک متحرک بر حسب ثانیه به صورت $f(t) = t^2 - 5t + 7$ است. در چه لحظه ای سرعت متوسط این متحرک در بازه زمانی $[1, 3]$ با سرعت لحظه ای برابر می شود؟
۱/۲۵	۱۶	مقادیر اکسترمم مطلق تابع $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ را در بازه $[-2, 2]$ بیابید.
۱/۲۵	۱۷	مقادیر a, b را چنان بیابید که نقطه $(-1, 2)$ اکسترمم نسبی تابع $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5$ باشد.
۲۰	موفق باشید جمع	

۱/۵	$\cos x - \sin x = \sqrt{2} \Rightarrow \underbrace{(\cos x - \sin x)^2}_{(۰/۲۵)} = 2$ $\Rightarrow \underbrace{\cos^2 x + \sin^2 x - 2 \sin x \cos x}_{(۰/۲۵)} = 2$ $\Rightarrow \underbrace{\sin 2x}_{(۰/۲۵)} = -1$ $\Rightarrow \underbrace{x = k\pi - \frac{\pi}{4}}_{(۰/۲۵)}$ با امتحان جواب، فقط جواب‌های به فرم $x = 2k\pi - \frac{\pi}{4}$ قابل قبول است، (۰/۲۵) که دو تابع در بازه $[0, 2\pi]$ فقط یک نقطه برخورد $\frac{7\pi}{4}$ دارند. (۰/۲۵) (صفحه ۴۰)	۷
۱/۲۵	$\frac{3}{4}T = \frac{\pi}{2} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{ b } \Rightarrow \underbrace{b}_{(۰/۲۵)} = 3$ $\left. \begin{array}{l} \max = 3 = c + a \\ \min = -1 = c - a \end{array} \right\} \Rightarrow \underbrace{c = 1}_{(۰/۲۵)}, a = 2 \Rightarrow \underbrace{a = -2}_{(۰/۲۵)}$ (صفحه ۳۴)	۸
۱	الف) ۲ (۰/۲۵) ب) -۲ (۰/۲۵) ج) $-\infty$ (۰/۲۵) د) $+\infty$ (۰/۲۵) (صفحه ۴۸ و ۶۱)	۹
۱/۲۵	$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 - x - 6}{x^2 - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(2x+3)(x-2)}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x+3}{x-2} = \frac{7}{0^+} = \underbrace{+\infty}_{(۰/۲۵)}$ $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 - x - 6}{x^2 - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(2x+3)(x-2)}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x+3}{x-2} = \frac{7}{0^-} = \underbrace{-\infty}_{(۰/۲۵)}$ $x = 2$ مجانب قائم است.  (۰/۲۵) (صفحه ۵۷)	۱۰

۱/۲۵	الف) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1-2x}{\sqrt{x^2-1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{ x } = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{-x} = 2$ (۰/۲۵) (صفحه ۶۶) ب) $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{[x]}{\tan x} = \frac{-2}{\infty} = 0$ (۰/۲۵) (صفحه ۶۹)	۱۱
۱/۲۵	تابع f در نقطه a مشتق پذیر است. پس (۰/۲۵) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = L$ لذا $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = L \times 0 = 0$ (۰/۲۵) (۰/۵) پس (۰/۲۵) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ یعنی تابع f در نقطه a پیوسته است. (صفحه ۸۶)	۱۲
۱/۵	الف) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} + 6}{2x^2 - x - 1} \Rightarrow f'(x) = \frac{\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}(2x^2 - x - 1) - (\sqrt[3]{x} + 6)(2x - 1)}{(2x^2 - x - 1)^2}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) ب) $f(x) = x^2 \cdot \sin^2 x \Rightarrow f'(x) = 2x \cdot \sin^2 x + x^2 (\cos x) (2 \sin x)$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (صفحه ۹۷)	۱۳

۱/۲۵	$\underbrace{f'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)}}_{(۰/۲۵)} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{۲x - ۱ - ((-1)^۲ - ۴)}{x + ۱}}_{(۰/۲۵)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{۲x + ۲}{x + ۱} = ۲$ $\underbrace{f'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)}}_{(۰/۲۵)} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^۲ - ۴ - ((-1)^۲ - ۴)}{x + ۱}}_{(۰/۲۵)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^۲ - ۱}{x + ۱} = -۲$ چون $f'_-(-1) \neq f'_+(-1)$ تابع در نقطه ۱- مشتق پذیر نیست. (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۰)	۱۴
۱	$\text{سرعت متوسط} = \frac{f(۳) - f(۱)}{۳ - ۱} = \frac{(۳^۲ - ۵(۳) + ۷) - (۱^۲ - ۵(۱) + ۷)}{۲} = -۱$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $\text{سرعت لحظه ای} = f'(t) = ۲t - ۵ = -۱ \Rightarrow t = ۲$ (۰/۲۵) در لحظه $t = ۲$ سرعت متوسط این متحرک در بازه زمانی $[۱, ۳]$ با سرعت لحظه ای برابر می شود. (۰/۲۵) (صفحه ۱۱۰)	۱۵
۱/۲۵	$f(x) = x^۳ - ۳x^۲ - ۹x + ۱ \Rightarrow f'(x) = ۳x^۲ - ۶x - ۹ = ۰ \Rightarrow x = -۱, x = ۳ \notin [-۲, ۲]$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $f(-۲) = -۱, f(۲) = -۲۱, f(-۱) = ۶ \Rightarrow ۶ = \text{ماکسیمم مطلق}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $-۲۱ = \text{مینیمم مطلق}$ (۰/۲۵) (صفحه ۱۱۸)	۱۶
۱/۲۵	$f(x) = x^۳ + ax^۲ + bx + ۵ \Rightarrow f'(x) = ۳x^۲ + ۲ax + b \xrightarrow{x=-1} ۳(-۱)^۲ + ۲a(-۱) + b = ۰$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $f(x) = x^۳ + ax^۲ + bx + ۵ \xrightarrow{x=-1} (-۱)^۳ + a(-۱)^۲ + b(-۱) + ۵ = ۲$ (۰/۲۵) $\begin{cases} b - ۲a = -۳ \\ -b + a = -۲ \end{cases} \Rightarrow \underbrace{a = ۵}_{(۰/۲۵)}, \underbrace{b = ۷}_{(۰/۲۵)}$ (صفحه ۱۲۶)	۱۷
۲۰	جمع	موفق باشید